

Para pacientes de 12 años o más, después de que dos tratamientos sistémicos de la EICH crónica no hayan funcionado...

Descubra nuevas posibilidades con REZUROCK

Descubra cómo REZUROCK
puede ayudarle a mejorar su
EICH crónica.

REZUROCK[®]
(belumosudil) tablets



No es un paciente real.
Todos los individuos que aparecen son actores.

EICH, enfermedad de injerto contra huésped.

USO

REZUROCK[®] (belumosudil) es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos y niños de 12 años o más con enfermedad crónica de injerto contra huésped (EICH crónica) después de haber recibido al menos 2 tratamientos previos (terapia sistémica) y que no hayan funcionado. Se desconoce si REZUROCK es seguro y eficaz en niños menores de 12 años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar REZUROCK, informe a su profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si:

- Padece problemas renales o hepáticos.
- está embarazada o planea quedarse embarazada. REZUROCK puede ser perjudicial para el feto. Si consigue quedarse embarazada, su profesional de la salud realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con REZUROCK. Informe a su profesional de la salud si se queda embarazada o cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con REZUROCK.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Tomando el control de su proceso con la EICH crónica

Cuando se desarrolla una EICH crónica, esto provoca que su sistema inmunológico se desequilibre, creando demasiadas células y moléculas y no suficiente de otras, lo que puede dañar diferentes partes del cuerpo.

El desequilibrio del sistema inmunológico causado por la EICH crónica puede provocar inflamación (hinchazón) y fibrosis (endurecimiento y cicatrices), que pueden dañar sus órganos.

Inflamación y fibrosis: un doble desafío de la EICH crónica



La inflamación es la hinchazón que ocurre cuando su cuerpo intenta protegerse.



La fibrosis es el crecimiento de tejido cicatricial que se endurece y evita que sus órganos funcionen correctamente. En algunas personas, la fibrosis ocurre cuando la inflamación persiste durante mucho tiempo. También es posible que se forme tejido cicatricial sin ninguna inflamación.

Para asignarle un tratamiento para la EICH crónica, su equipo de atención médica puede considerar varios factores importantes, entre ellos:



La gravedad general de su EICH crónica



El efecto que tiene la EICH crónica en su vida diaria y actividades



Órganos implicados

En algunos casos, su médico también puede recomendar tratamientos locales para ayudar a controlar problemas específicos, por ejemplo, gotas para la sequedad ocular o cremas para erupciones cutáneas. Estos pueden utilizarse como parte de su plan general de tratamiento.

Tomando el control de su proceso crónico con EICH (continuación)



Medicamentos que tratan la EICH crónica

En lo que respecta al tratamiento de la EICH crónica, existen diferentes tipos de tratamientos disponibles. La mayoría de los pacientes comienzan con una terapia inmunosupresora para ayudar a controlar sus síntomas. Algunas personas pueden necesitar un enfoque diferente. La EICH crónica es una enfermedad crónica y los tratamientos pueden dejar de funcionar con el tiempo.



Los medicamentos para la EICH crónica pueden ayudar a:

- Aliviar los síntomas
- Abordar los múltiples impactos que la EICH crónica puede tener en el cuerpo



Recuerde, usted tiene el poder de defender su plan de tratamiento

Si sigue notando síntomas o siente que su medicación no funciona tan bien como antes, o su afección no está tan controlada como antes, hable con su equipo de atención médica.

Con su equipo de atención médica, puede explorar si puede ser momento de buscar otras opciones que se adapten mejor a usted.

Usted conoce mejor su cuerpo.

Si nota algún cambio en cómo se siente, anótelos y compártalos con su equipo de atención médica en su próxima cita. Esto puede ayudarle a entender qué pueden significar estos síntomas y si su tratamiento actual sigue satisfaciendo sus necesidades.



Haga clic o toque en el código QR para descargar una herramienta que le ayudará a controlar sus síntomas y facilitar las conversaciones con su equipo de atención médica.

Una vía ROCK2 hiperactiva puede influir en la EICH crónica. ¿Cómo afecta esto a su cuerpo?




¿Qué es la vía ROCK2?

Muchos sistemas del cuerpo actúan a través de lo que se llaman "vías". Estas vías son una serie de acciones que tienen lugar entre células y moléculas del cuerpo. Una de estas vías se llama "ROCK2". En personas con EICH crónica, esta vía ROCK2 es demasiado activa.

Una vía ROCK2 hiperactiva conduce a:

- Una disminución de células y moléculas que ayudan a mantener el sistema inmunológico bajo control
- Un aumento de células y moléculas que causan inflamación y fibrosis



El resultado de una vía ROCK2 hiperactiva es un sistema inmunológico desequilibrado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar REZUROCK, informe a su profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si usted: (continuación)

- **Las mujeres** que puedan quedar embarazadas deben usar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con REZUROCK y durante una semana después de la última dosis.
- **Los hombres** cuyas parejas puedan quedar embarazadas deben usar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con REZUROCK y durante una semana después de la última dosis.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Descubra una forma diferente de tratar la EICH crónica




¿Qué es REZUROCK?

REZUROCK es un comprimido diario para pacientes de 12 años o más con EICH crónica después de 2 tratamientos sistémicos previos que no funcionaron.

¿Cómo funciona REZUROCK?

REZUROCK funciona de forma diferente bloqueando la vía ROCK2. Esto puede reducir la inflamación y fibrosis que pueden ocurrir con la EICH crónica.



REZUROCK puede ayudar a reequilibrar su sistema inmunológico.



Descubra cómo funciona REZUROCK.

Haga clic o toque en el código QR para ver un video de REZUROCK en acción.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar REZUROCK, informe a su profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si usted: (continuación)

- está amamantando o tiene planeado amamantar. Se desconoce si REZUROCK pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con REZUROCK y durante una semana después de la última dosis.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Entendiendo los estudios clínicos de REZUROCK

REZUROCK[®]
(belumosudil) tablets

REZUROCK es para pacientes de 12 años o más con EICH crónica después de 2 tratamientos sistémicos previos que no funcionaron

REZUROCK fue evaluado en:

2 Estudios clínicos

Incluyó un total de:

186 personas con EICH crónica

El estudio ROCKstar incluía:

132 personas

El estudio KD025-208 incluía:

54 personas

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos de venta con receta médica o de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. REZUROCK puede afectar al modo en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar al modo en que actúa REZUROCK. Conozca las medicinas que toma. Guarde una lista de estas para mostrársela a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Jen

Paciente real de REZUROCK compensada por Sanofi.



Diferentes grupos de personas tomaron REZUROCK en los estudios

REZUROCK[®]
(belumosudil) tablets

Entre las personas que obtuvieron resultados en los estudios clínicos se encontraban:



Personas que probaron inmunosupresores, como esteroides, y otros medicamentos para la EICH crónica que no lograron controlar sus síntomas



Personas con EICH crónica leve, moderada y grave



Personas con EICH crónica en uno o más órganos



Hay más que aprender sobre los resultados del estudio ROCKstar.

Haga clic o toque en el código QR para visitar [REZUROCK.com](https://www.REZUROCK.com).



Jen, paciente real de REZUROCK compensada por Sanofi. La otra persona que aparece es un actor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cómo debería tomar REZUROCK?

- Tome REZUROCK exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
- No cambie su dosis ni deje de tomar REZUROCK sin antes hablar con su proveedor de atención médica.
- Tome REZUROCK una vez al día con una comida.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Cómo puede REZUROCK ayudar a mejorar su EICH crónica

REZUROCK[®]
(belumosudil) tablets



3 de cada 4 personas

El 75% de las personas en el estudio ROCKstar notaron una mejoría en su EICH crónica

- Más de la mitad de las personas que experimentaron una mejoría lo hicieron entre **las semanas 4 y 8**
- Casi todos los que experimentaron una mejoría lo hicieron en **la semana 24**
- Los medicamentos pueden afectar a cada persona de forma diferente. Algunas personas pueden tardar más en responder, especialmente si tienen una enfermedad grave causada por fibrosis

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cómo debería tomar REZUROCK? (continuación)

- Tome REZUROCK aproximadamente a la misma hora cada día.
- Tome los comprimidos de REZUROCK enteros con un vaso de agua.
- No corte, triture ni mastique las comprimidos de REZUROCK.
- Su profesional de la salud le hará análisis de sangre para revisar su hígado al menos una vez al mes durante el tratamiento con REZUROCK.


Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la **Información de Prescripción**.



No es un paciente real.

Se observaron respuestas en varios órganos

REZUROCK[®]
(belumosudil) tablets



En algunas personas que tomaban REZUROCK:

- ✓ Se observó una reducción **en el uso de esteroides^a**
- ✓ **hubo mejoras en la calidad de vida**, según se recoge en un análisis exploratorio^b

^aNo se pueden extraer conclusiones definitivas sobre el efecto de REZUROCK a partir de estos datos.

^bUn análisis exploratorio proporciona una mejor comprensión de un problema, pero no constituye una prueba. Es difícil medir la calidad de vida porque las personas son diferentes y tendrán experiencias únicas con el tratamiento.

No se pueden extraer conclusiones definitivas sobre el efecto de REZUROCK a partir de estos datos. Además, el estudio ROCKstar midió la respuesta global en todos los órganos, por lo que la mejora en un órgano puede no significar un beneficio global.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cómo debería tomar REZUROCK? (continuación)

- Si se olvida una dosis de REZUROCK, tómese tan pronto como lo recuerde el mismo día. Tome su siguiente dosis de REZUROCK a su hora habitual al día siguiente. No tome dosis extra de REZUROCK para compensar una dosis olvidada.
- Si toma demasiado REZUROCK, llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

¿Cuáles son los efectos secundarios de REZUROCK?



Estos fueron los efectos secundarios más comunes comunicados por las personas que tomaban REZUROCK en los dos estudios clínicos

- Infecciones
- Cansancio o debilidad
- Náuseas
- Diarrea
- Falta de aliento
- Tos
- Hinchazón
- Hemorragia
- Dolor abdominal
- Dolor muscular u óseo
- Dolor de cabeza
- Hipertensión

REZUROCK puede afectar la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Hable con su profesional de la salud si esto le preocupa. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de REZUROCK.

Información adicional de los estudios clínicos



En los estudios clínicos, no se registraron nuevos casos de infección por citomegalovirus (CMV) y solo 1 caso de infección recurrente por CMV. El CMV es una infección grave y frecuente que puede afectar a las personas que se han sometido a un trasplante de células madre sanguíneas.



En los estudios clínicos, alrededor del 4% de los participantes, es decir, 1 de cada 25, presentó citopenia grave, una afección en la que el nivel de determinadas células sanguíneas es inferior al normal.

Efectos secundarios de REZurock (cont.)



Si padece EICH crónica, hable con su profesional de la salud sobre cómo seguir tomando REZUROCK el tiempo que sea necesario.

Esto es muy importante. Asegúrese de informar a su profesional de la salud sobre cualquier efecto secundario que pueda tener. Quizá puedan ayudarle a encontrar formas de controlarlos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de REZUROCK?

Los efectos secundarios más comunes de REZUROCK incluyen:

- infecciones
- náuseas
- dificultad para respirar
- cansancio o debilidad
- diarrea
- tos

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

No es un paciente real.



Cómo tomar REZUROCK

REZUROCK[®]
(belumosudil) tablets

El comprimido REZUROCK de 200 mg se toma por vía oral una vez al día con una comida



¿Cómo y cuándo debo tomar REZUROCK?

Tome REZUROCK aproximadamente a la misma hora cada día con una comida. Recuerde, una comida debe tener calorías similares a las que comería en el almuerzo o la cena: es más que una simple merienda.



¿Puedo triturar o masticar el comprimido REZUROCK?

El comprimido REZUROCK debe tragarse entero con un vaso de agua. Es muy importante que **no corte, triture ni mastique el comprimido**.



¿Qué pasa si me salto una dosis de REZUROCK?

Si se olvida una dosis de REZUROCK, tómese tan pronto como lo recuerde el mismo día. Tome la siguiente dosis de REZUROCK a la hora habitual al día siguiente.

No tome una dosis adicional de REZUROCK para compensar una dosis olvidada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de REZUROCK? (continuación)

Los efectos secundarios más comunes de REZUROCK incluyen:

- hinchazón
- dolor muscular u óseo
- hemorragia
- dolor de cabeza
- dolor abdominal
- hipertensión



¿Cómo debo almacenar REZUROCK?

REZUROCK debe almacenarse a temperatura ambiente, que oscile entre 68 °F y 77 °F (20 °C–25 °C), en su recipiente original para protegerlo de la humedad. Asegúrese de cerrar bien la tapa cada vez después de tomarse el comprimido.

No deseche el sobre desecante que hay dentro de la botella.



Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Cómo tomar REZUROCK (continuación)

Asegúrese de tomar REZUROCK una vez al día, según lo prescrito por su equipo de atención médica

- Hable siempre con su equipo de atención médica sobre cualquier cambio en su medicación. Conozca las medicinas que toma. Guarde una lista de estas para mostrársela a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.
- No empiece ni deje de tomar ningún medicamento sin consultarlo primero con su equipo de atención médica. Si experimenta algún efecto secundario, asegúrese de informar a su equipo de atención médica de inmediato
- Si toma REZUROCK, asegúrese de informar a su equipo de atención médica sobre todos los medicamentos de venta libre y con receta (incluidos inhibidores de la bomba de protones, o IBP), vitaminas y productos a base de hierbas que está tomando, porque pueden afectar el funcionamiento de REZUROCK



Haga clic o toque en el código QR para escuchar a pacientes reales y su experiencia tomando REZUROCK.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Su profesional de la salud puede cambiar su dosis de REZUROCK, suspender temporalmente o detener definitivamente el tratamiento si presenta ciertos efectos secundarios.

REZUROCK puede afectar la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Hable con su profesional de la salud si esto le preocupa.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento.

Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Jen

Paciente real de REZUROCK
compensada por Sanofi.
Otros individuos que
aparecen son actores.



MyROCK ASSIST™ está aquí para ayudarle

REZUROCK®
(belumosudil) tablets

MyROCK
ASSIST™

MyROCK ASSIST se esfuerza por ayudar a las personas con EICH crónica y a sus cuidadores a obtener lo que necesitan, en cada paso del camino

El equipo MyROCK ASSIST está disponible para ayudarle de lunes a viernes, de 8 :00 AM a 8 : 00 pm ET.

MyROCK ASSIST está disponible para ayudar a personas elegibles a:

- ✓ Determinar la cobertura y los costos del seguro para REZUROCK
- ✓ Encontrar un programa de ahorro al que puedan optar
- ✓ Recibir sus medicamentos directamente a domicilio a través de una farmacia especializada

Sanofi no proporciona asesoramiento médico, diagnósticos ni recomendaciones de tratamiento médico.

No es un paciente real.
Todos los individuos que aparecen son actores.



MyROCK ASSIST™ está aquí para ayudarle

REZUROCK®
(belumosudil) tablets

MyROCK
ASSIST™

Las personas elegibles con seguro comercial o privado pueden recibir REZUROCK por tan solo 0 DÓLARES AL MES a través del programa de ahorro para copago comercial MyROCK ASSIST.^a

Obtenga más información sobre los programas de apoyo MyROCK ASSIST diseñados para personas que necesitan tratamiento para la EICH crónica en **REZUROCK.com**, o llame al 1-844-523-6661.



Haga clic o toque en el código QR para inscribirse hoy.



No es un paciente real. Todos los individuos que aparecen son actores.

^aTérminos y condiciones para el paciente: El Programa de Ahorro Comercial con Copago MyROCK ASSIST ofrece apoyo de copago/coseguro para los gastos de bolsillo de las recetas de comprimidos REZUROCK® (belumosudil). Se aplica un beneficio máximo anual. Límite de un suministro de 30 días cada 30 días. Este programa no es un seguro de salud. Este programa es solo para pacientes con seguro comercial o privado; los pacientes sin seguro o que pagan en efectivo no son elegibles. Los pacientes no son elegibles si las recetas son pagadas, total o parcialmente, por cualquier programa financiado por cualquier estado o el gobierno federal, incluyendo, pero no limitado a, Medicare (incluida la Parte D, incluso durante el período sin cobertura) o Medicaid, Medigap, VA, DOD, TriCare, planes de indemnización privada o HMO que le reembolsan el costo total de sus medicamentos recetados, o en los casos en que lo prohíba la ley. El programa de copago no puede combinarse con ningún otro reembolso, cupón u oferta. Sanofi se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar esta oferta en cualquier momento sin necesidad de aviso previo. Los ahorros proporcionados por el programa podrían variar dependiendo de los gastos de bolsillo de los pacientes. Este programa está diseñado para ayudar a los pacientes a poder costearse REZUROCK. Es posible que los pacientes tengan planes de seguros que intenten diluir el impacto de la ayuda disponible en el programa. En tales situaciones, el programa podría modificar sus condiciones. La tarjeta es válida hasta el 31 de diciembre del año de activación. El 1 de enero del año siguiente, la tarjeta se restablece automáticamente y está sujeta a límites anuales si el beneficio de medicamentos con receta sigue siendo el mismo. Un representante de Sanofi puede contactar con el paciente para hacer seguimiento de cualquier evento adverso que pueda ser notificado. Los pacientes recibirán todos los detalles del programa al inscribirse.

Preparándose para su conversación sobre REZUROCK



El tiempo que pasa con su equipo de atención médica es importante. Preparar preguntas con antelación le ayuda a aprovechar al máximo su visita. Puede usar esta guía para anotar preguntas sobre REZUROCK. Junto con esta guía, lleve cualquier otro registro o un diario que pueda tener para ayudarle en esta conversación.

Durante su visita:



- Defienda sus propios intereses:

Si tiene preguntas sobre su medicación actual o plan de tratamiento, ahora es un buen momento para hacer preguntas a su médico.



Informe a su médico sobre cualquier novedad:

Los síntomas pueden afectar a cada persona de forma diferente, así que hablar desde su propia experiencia puede ayudar a su médico a entender a qué se enfrenta.

Para ayudarle a prepararse para su próxima cita, anote las tres preguntas más importantes que tenga sobre REZUROCK:

1. _____
2. _____
3. _____

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Su profesional de la salud puede cambiar su dosis de REZUROCK, suspender temporalmente o detener definitivamente el tratamiento si presenta ciertos efectos secundarios. (continuación)

Antes de tomar REZUROCK, comunique a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, incluyendo si:

- padece problemas renales o hepáticos.
- está embarazada o planea quedarse embarazada. REZUROCK puede ser perjudicial para el feto. Si consigue quedarse embarazada, su profesional de la salud realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con REZUROCK. Informe a su profesional de la salud si se queda embarazada o cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con REZUROCK.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Uso e información importante de seguridad



USO

REZUROCK® (belumosudil) es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos y niños de 12 años o más con enfermedad crónica de injerto contra huésped (EICH crónica) después de haber recibido al menos 2 tratamientos previos (terapia sistémica) y que no hayan funcionado. Se desconoce si REZUROCK es seguro y eficaz en niños menores de 12 años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar REZUROCK, informe a su profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si:

- Tiene problemas renales o hepáticos.
- está embarazada o planea quedarse embarazada. REZUROCK puede ser perjudicial para el feto. Si consigue quedarse embarazada, su profesional de la salud realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con REZUROCK. Informe a su profesional de la salud si se queda embarazada o cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con REZUROCK.
 - **Las mujeres** que puedan quedarse embarazadas deben usar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con REZUROCK y durante una semana después de la última dosis.
 - **Los hombres** cuyas parejas puedan quedarse embarazadas deben usar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con REZUROCK y durante una semana después de la última dosis.
- está amamantando o tiene planeado amamantar. Se desconoce si REZUROCK pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con REZUROCK y durante una semana después de la última dosis.

Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. REZUROCK puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar el funcionamiento de REZUROCK.

Conozca las medicinas que toma. Guarde una lista de estas para mostrársela a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico cuando reciba un nuevo medicamento.

¿Cómo debería tomar REZUROCK?

- Tome REZUROCK exactamente como se lo indica su proveedor de atención médica.
- No cambie su dosis ni deje de tomar REZUROCK sin antes hablar con su profesional de la salud.
- Tome REZUROCK una vez al día con una comida.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Uso e información importante de seguridad (cont)



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cómo debería tomar REZUROCK? (continuación)

- Tome REZUROCK aproximadamente a la misma hora cada día.
- Tome los comprimidos enteros de REZUROCK con un vaso de agua.
- No corte, triture ni mastique los comprimidos de REZUROCK.
- Su profesional de la salud le hará análisis de sangre para revisar su hígado al menos una vez al mes durante el tratamiento con REZUROCK.
- Si se olvida una dosis de REZUROCK, tómese la en cuanto se acuerde el mismo día. Tome su siguiente dosis de REZUROCK a su hora habitual al día siguiente. No tome dosis adicionales de REZUROCK para compensar una dosis olvidada.
- Si toma demasiado REZUROCK, llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de REZUROCK?

Los efectos secundarios más comunes de REZUROCK incluyen:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| • infecciones | • hinchazón |
| • cansancio o debilidad | • hemorragias |
| • náuseas | • dolor abdominal |
| • diarrea | • dolor muscular o de huesos |
| • dificultad para respirar | • dolor de cabeza |
| • tos | • hipertensión |

Su profesional de la salud puede cambiar su dosis de REZUROCK, suspender temporalmente o detener definitivamente el tratamiento si presenta ciertos efectos secundarios.

REZUROCK puede afectar la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Hable con su profesional de la salud si esto le preocupa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de REZUROCK. Llame a su proveedor de atención médica para recibir asesoramiento sobre los efectos secundarios.

Le recomendamos que notifique de los efectos secundarios de los medicamentos con receta a la FDA. Visite www.FDA.gov/medwatch o llame al **1-800-FDA-1088**. También puede contactar con Kadmon Pharmaceuticals, LLC, una empresa de Sanofi, en el 1-800-633-1610 para informar de sus efectos secundarios.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Para pacientes de 12 años o más, después de que dos tratamientos sistémicos de la EICH crónica no hayan funcionado...

Descubra nuevas posibilidades con REZUROCK

Descubra cómo REZUROCK puede ayudarle a mejorar su EICH crónica

- REZUROCK es el único medicamento aprobado que bloquea la vía ROCK2 para ayudar a **reequilibrar** su sistema inmunológico. Puede **reducir la inflamación y la fibrosis** que pueden ocurrir con la EICH crónica
- **El 75% de las personas** (es decir, 3 de cada 4) en el estudio ROCKstar notaron **una mejoría en su EICH crónica**
- Más de la mitad de las personas que experimentaron una mejoría lo hicieron entre **las semanas 4 y 8**
- Algunas personas observaron **una reducción en el uso de esteroides^a**
- **Algunas personas experimentaron mejorías en su calidad de vida**, según se informó en un análisis exploratorio^b
- REZUROCK es un **comprimido** oral diario que se toma con una comida a **la misma hora cada día**
- **Antes de tomar REZUROCK, informe a su profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo** si tiene problemas renales o hepáticos, está embarazada o planea quedarse embarazada, o está amamantando o planea hacerlo. Tanto las mujeres que pueden quedarse embarazadas como los hombres con pareja femenina que sí pueden quedarse embarazadas deben utilizar anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante una semana después de la última dosis
- **Los efectos secundarios más comunes de REZUROCK** incluyen infecciones, cansancio o debilidad, náuseas, diarrea, dificultad para respirar, tos, hinchazón, hemorragias, dolor de estómago (abdominal), dolor muscular o de huesos, dolor de cabeza e hipertensión



Haga clic o toque en el código QR o visite REZUROCK.com, donde encontrará todo lo que necesita sobre la EICH crónica, REZUROCK y MyROCK ASSIST™.

^aNo se pueden extraer conclusiones definitivas sobre el efecto de REZUROCK a partir de estos datos.

^bUn análisis exploratorio proporciona una mejor comprensión de un problema, pero no constituye una prueba. Es difícil medir la calidad de vida porque las personas son diferentes y tendrán experiencias únicas con el tratamiento.

USO

REZUROCK® (belumosudil) es un medicamento con receta utilizado para tratar a adultos y niños de 12 años o más con enfermedad crónica de injerto contra huésped (EICH crónica) después de haber recibido al menos 2 tratamientos previos (terapia sistémica) y que no hayan funcionado. Se desconoce si REZUROCK es seguro y eficaz en niños menores de 12 años.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cómo debería tomar REZUROCK? (continuación)

- Si se olvida una dosis de REZUROCK, tómese la tan pronto como lo recuerde el mismo día. Tome su siguiente dosis de REZUROCK a su hora habitual al día siguiente. No tome dosis adicionales de REZUROCK para compensar una dosis olvidada.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento. Vea toda la [Información de Prescripción](#).

Sanofi no ofrece asesoramiento, diagnóstico ni tratamiento médico. La información médica que se incluye aquí se ofrece únicamente con fines educativos generales. Su proveedor de atención médica es la mejor fuente de información respecto a su salud. Consulte con su profesional de atención médica si tiene alguna pregunta acerca de su salud o su tratamiento.

sanofi

© 2026 Sanofi. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad del grupo Sanofi.
MAT-US-2203951-v6.0-09/2026

REZUROCK[®]
(belumosudil) tablets